

COMMENT nourrir avec les produits LAKMIL® (à lire attentivement !)

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous ferons tout notre possible pour vous accompagner dans votre démarche de nourrissage, de vos chiots ou de vos chatons dans le besoin ou sans mère.

Le **nombre** de tétées ou de repas dépend fondamentalement de **l'âge**. À cela s'ajoutent les facteurs : taille et poids.

Alors que les nouveau-nés viennent aux tétines de leur mère presque toutes **les heures à 2 heures**, cela diminue avec l'âge, jusqu'au sectionnement complet de l'ombilic. Un chiot, un chaton ou un autre bébé animal doit être soigné de manière optimale pendant toute cette période s'il est élevé sans mère ou si la mère n'est disponible que de manière limitée !

Les aides à l'alimentation suivantes **sont purement des recommandations** et non des conseils ou des instructions médicales. C'est notre longue expérience que nous sommes heureux de vous transmettre.

(Si vous avez des questions sur nos produits ou nos postes de soins d'urgence, veuillez nous contacter. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site Internet www.lakmil.de)



Bon courage pour élever votre bébé animal.

LA PRÉPARATION

- ✓ ✓ Préparez **le lait** le plus **FRAIS** possible. Il n'y a pas de mal à réchauffer après, mais rappelez-vous **que le lait ne contient ni conservateur ni antioxydant !**
Si le lait est réchauffé, faites le si possible dans un bain-marie ou dans un chauffe-biberon. Puis remuez bien pour que tous les ingrédients se mélangent bien à nouveau.
(Recommandation : au bain-marie. Éviter le micro-ondes pour ne pas détruire les ingrédients.)
- ✓ **Eau exempte de germes.** Dans certaines régions, l'eau du robinet n'est pas assez propre pour un petit bébé animal.
(Recommandation: achetez de l'«eau plate» pendant les 3-4 premières semaines ou faites bouillir l'eau du robinet, sans germe = faire bouillir pendant au moins 3 minutes)
- ✓ **Incorporer de l'eau DANS la poudre.** La poudre étant difficile à mélanger, en raison de ses ingrédients naturels, elle pourrait flotter sur le dessus.
- ✓ Les **SACS LAKMIL®** tiennent solidement sur votre table. Ainsi, vous pouvez facilement retirer la poudre avec votre cuillère doseuse. Nos emballages sont légers, hermétiques et refermables.
(Recommandation : ne pas conserver au dessus de 25°. Au frigo dans le bac à légumes ou dans la porte c'est parfait)


Température de mélange: 50-55°

Bien remuer avec un fouet, secouer ou bien mélanger dans le biberon (enlever ensuite la mousse pour que le chiot n'aspire pas d'air et s'étouffe).

Température d'alimentation: 38° maximum

(la température corporelle de la mère est d'environ 38,5°).

→ Jamais moins **de 35°** C'est trop froid pour le chiot/chaton. Ils ont besoin d'au moins 34° pour leur digestion.

- ➔ *Avant de nourrir votre chiot, chaton ou autre bébé animal, pesez le avant et après le nourrissage. Parfois, la quantité bu est à peine visible, de cette façon vous saurez précisément la quantité de lait bu.*
- ➔ *Un tableau pour noter les prises de poids des petits, est disponible gratuitement sur notre site Web Plan d'alimentation*  **LAKMIL®** prêt à télécharger

L'ALIMENTATION

Vous trouverez des biberons, des aides à l'alimentation et des sondes dans notre boutique www.lakmil.de.



- ◆ Avec les bouteilles standard, assurez-vous qu'elles ne s'étouffent pas.
- ◆ Avec notre tétine à 3 niveaux, cela peut être facilement réglé en tournant le biberon.
- ◆ Dans le cas de la petite bouteille souple, vous devez percer vous-même le trou. Nous incluons une aiguille pour l'ouverture progressive.



! Attention: les trous **ne doivent pas être trop gros**, sinon le débit est trop fort et le bébé animal peut s'étouffer dangereusement.

! Attention: les trous **ne doivent pas être trop petits**, sinon le bébé animal n'en aura pas assez et sera fatigué de téter. N'a donc presque rien bu et s'endort d'épuisement.

Afin de calculer ou d'estimer vos besoins approximatifs, vous pouvez utiliser le tableau ici pour savoir quelle quantité de lait les chiots peuvent consommer **en moyenne**.

- x Les petits doivent être nourris **JOUR et NUIT**. 5-6 repas ne suffisent donc pas.
- x Les chiots et les chatons ont besoin de nourriture **toutes les heures** pendant les premiers jours.
- x Après cela, il se stabilise toutes les **2 heures**. Jour et nuit!
- x Après le repas = frotter le ventre pour la digestion. Important!
- x Maintenez une température constante dans la caisse de mise bas, pas de courants d'air (qui pourrait également entraîner la diarrhée) 28° serait bien.
- x **La température ambiante** ne doit pas inférieure à 26° (recommandation)
- x **La température ambiante directement** au niveau du chiot serait de 30° recommandée.

ATTENTION : Les Animaux ne sont pas DES MACHINES. Le besoin de nourriture peut varier. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce qui est possible.

| Âge en semaines | Repas par 24 heures JOUR ET NUIT | Petites races <10kg POIDS FINAL | Races moyennes 10-25kg POIDS FINAL | Grandes races >25 kg POIDS FINAL |
|----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Dans la 1ère semaine | environ 12-16x (ou au besoin) | 10-25ml | 15-30ml | 20-45ml |
| 1. Semaine | environ 9-12x (ou au besoin) | 10-25ml | 25-30ml | 25-45ml |
| 2. Semaine | environ 6-9x (ou au besoin) | 30-40ml | 50-60ml | 70-80ml |
| 3. Semaine | Environ 3-5x (ici vous pouvez commencer à vous nourrir) | 50-60ml | 70-80ml | 120-140ml |
| 4. Semaine | Passage à la purée PHASE 2 | 60-70ml | 70-80ml | 120-140ml |

Nourrir les chatons est un peu différent. Au cours **des 3 premiers jours** environ, ils absorbent très peu, parfois **seulement 1 à 2 ml par repas**. Par conséquent, veuillez toujours préparer du lait frais **toutes les heures**.

Non seulement la nourriture est importante, mais encore plus importante est la consommation de liquide chez les bébés animaux. Cela peut durer jusqu'au **3ème ou 4ème jour**, puis cela peut se stabiliser toutes **les 2 heures**. C'est aussi le **JOUR et la NUIT**. (2-4 ml par repas). Le nourrissage avec une alimentation approprié au chaton doit durer environ 3,5 à 4 semaines.

| COLOSTRUM 24 | | |
|---|-----------------|-------------|
| juste après la naissance 12-24 heures | | |
| <p>Ouvrir la capsule et remuer le contenu. Jetez la coquille.</p> | | |
| <p>Eau sans germe</p> <p>Pour mélanger environ 50-55°</p> <p>Pour alimentation max 35°-38°</p> | | |
| 1 Gélule | 460mg (0,46g) | 2,76ml Eau |
| 2 Gélules | 920mg (0,92g) | 5,52ml Eau |
| 3 Gélules | 1380mg (1,38g) | 8,28ml Eau |
| 4 Gélules | 1840mg (1,84g) | 11,04ml Eau |
| 5 Gélules | 2300mg (2,30g) | 13,80ml Eau |
| 6 Gélules | 2760mg (2,76g) | 16,56ml Eau |
| 7 Gélules | 3220mg (3,22g) | 19,32ml Eau |
| 8 Gélules | 3680mg (3,68g) | 22,08ml Eau |
| 9 Gélules | 4140mg (4,14g) | 24,84ml Eau |
| 10 Gélules | 4600mg (4,60g) | 27,60ml Eau |
| 11 Gélules | 5060mg (5,06g) | 30,36ml Eau |

| PHASE 1 lait d'élevage | | |
|---|------|------------|
| Jour 1-2 | | |
| Entrée : un peu plus fine | | |
| <p>Eau sans germe</p> <p>Pour mélanger environ 50-55°</p> <p>Pour alimentation max 35°-38°</p> | | |
| poudre | 5g | 25ml Eau |
| | 25g | 125ml Eau |
| | 50g | 250ml Eau |
| | 100g | 500ml Eau |
| | 250g | 1250ml Eau |

| PHASE 1 lait d'élevage | | |
|---|------|------------|
| à partir du jour 2 environ | | |
| Après s'y être habitué : normalement liquide | | |
| <p>Eau sans germe</p> <p>Pour mélanger environ 50-55°</p> <p>Pour alimentation max 35°-38°</p> | | |
| poudre | 5g | 20ml Eau |
| | 25g | 100ml Eau |
| | 50g | 200ml Eau |
| | 100g | 400 ml Eau |
| | 250g | 1000ml Eau |

| PHASE 2 bouillie d'élevage | | |
|--|------|-----------|
| à partir d'environ 3,5 (4) semaines | | |
| <p>Eau sans germe</p> <p>Pour mélanger environ 50-55°</p> <p>laisser gonfler la poudre</p> <p>Pour alimentation max 35°-38°</p> | | |
| poudre | 25g | 50ml Eau |
| | 50g | 100ml Eau |
| | 75g | 150ml Eau |
| | 100g | 200ml Eau |
| | 125g | 250ml Eau |
| | 150g | 300ml Eau |
| | 175g | 350ml Eau |
| | 200g | 400ml Eau |
| | 250g | 450ml Eau |

LA PRÉPARATION

,Colostrum-24' Gélules - chaque gélule **460mg**
(plus de contenu que les capsules commerciales)

1 petite cuillère doseuse (plate, non bombée): **5g/10ml**
1 grande cuillère doseuse (plate, non bombée): **25g/50ml**

Astuce: Ne le remuez pas trop épais au début,
le bébé animal doit d'abord s'y habituer.

| 100% Lait de chèvre entier PUR | | |
|---|------|---------------------|
| SANS vitamines, minéraux et oligo-éléments LAKMIL® | | |
| Donc pas suffisant comme SOLE FEED !!! | | |
| Pour l'alimentation complémentaire aux aliments secs et/ou humides, animaux adultes/plus âgés | | |
| plus mince | | normalement liquide |
| 100% Lait de chèvre entier PUR | | |
| <p>Eau sans germe</p> <p>Pour mélanger environ 50-55°</p> <p>Pour alimentation max 35°-38°</p> | | |
| poudre | 5g | 25ml Eau |
| | 25g | 125ml Eau |
| | 50g | 250ml Eau |
| | 100g | 500ml Eau |
| | 250g | 1250ml Eau |
| | 5g | 20ml Eau |
| | 25g | 100ml Eau |
| | 50g | 200ml Eau |
| | 100g | 400 ml Eau |
| | 250g | 1000ml Eau |

